

BMSB TRAMPA



one₄all

TRAMPA PARA SEGUIMIENTO Y CAPTURA
DE JÓVENES Y ADULTOS DE CIMICE ASIÁTICA (*Halyomorpha halys*)
basada en la atracción inducida por feromonas de agregación

ÁMBITO DE FUNCIONAMIENTO:

La trampa, indicada para la captura de formas adultas y juveniles de BMSB (*Halyomorpha halys*), puede utilizarse para el seguimiento y la captura masiva de individuos de Cimice asiática, tanto en campo abierto como en zonas rurales caracterizadas por la presencia del insecto.

COMPOSICIÓN:

One4All BMSB Trap, se suministra, listo para montar, con 1 Feromona de 5 semanas de duración. La trampa, una vez montada, deberá estar anclada en el suelo con metodos diferentes en función de la tipología de substrato presente (asfalto,pedrería, terreno compacto, terreno cultivable, etc.)

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:

- Es aconsejable instalar al menos 4-5 trampas por explotación antes del período en que las formas adultas de hibernación asiática abandonan los refugios invernales para trasladarse a los campos de cultivo (a partir de mediados de abril).
- Nunca coloque las trampas dentro de la parcela que debe protegerse para no atraer al insecto dentro de la zona cultivada.
*[En caso de poblaciones elevadas de *Halyomorpha halys*, alrededor de las trampas colocadas en el interior del huerto se podrían producir incrementos de daños.]*
- Coloque la trampa en la dirección que conduce desde el hipotético punto de invernada (leña, almacén, alojamiento de herramientas, etc.) hasta el campo cultivado a proteger.
- Mantenga una distancia de al menos 30 m entre una trampa y la otra.

FUNCIONAMIENTO:

- Controlar y vaciar las trampas semanalmente.
- Cambiar las feromonas cada 5 semanas.

MONTAJE Y ANCLAJE DE LAS TRAMPAS:

Ensamblar las trampas anclando la base al suelo con piquetes o piedras de peso adecuado, para evitar que sean volcadas o barridas por el viento fuerte.

ADVERTENCIAS:

La elección de un lugar adecuado para colocar la trampa es fundamental para el éxito del seguimiento y la captura de las formas móviles del insecto

CAMBIO FEROMONAS:

La feromona suministrada ejerce una acción atrayente completa de 5 semanas. Después de este período, se recomienda sustituirlo por un nuevo conservado en condiciones ideales.

