

BMSB TRAPPOLA



one₄all

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DI GIOVANI E ADULTI DI CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halys*)
basata sull'attrazione indotta da feromoni di aggregazione

CAMPO D'IMPIEGO:

La trappola, indicata per la cattura di forme adulte e giovanili di BMSB (*Halyomorpha halys*), può essere impiegata per monitoraggio e cattura massale di individui di Cimice asiatica, sia in pieno campo che in aree rurali caratterizzate dalla presenza dell'insetto.

COMPOSIZIONE:

One4All BMSB Trap, viene fornita, pronta da assemblare, con 1 feromone della durata di 5 settimane.

La trappola, una volta montata, dovrà essere ancorata a terra con metodi differenti in funzione della tipologia di substrato presente (asfalto, pietraia, terreno compatto, terreno coltivabile, etc.).

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- È consigliabile installare almeno 4-5 trappole per azienda precedendo il periodo in cui le forme adulte svernanti di cimice asiatica abbandonano i rifugi invernali per portarsi nei campi coltivati (a partire da metà aprile).
- Non posizionare mai le trappole all'interno dell'apezzamento da proteggere per non attrarre l'insetto all'interno dell'area coltivata.
*[In caso di popolazioni elevate di *Halyomorpha halys*, attorno alle trappole poste all'interno del frutteto si potrebbero avere incrementi di danni.]*
- Posizionare la trappola nella direzione che conduce dall'ipotetico punto di svernamento (legnaia, magazzino, ricovero attrezzi, etc.) al campo coltivato da proteggere.
- Mantenere una distanza di almeno 30 m tra una trappola e l'altra.

OPERATIVITÀ:

- Controllare e svuotare settimanalmente le trappole.
- Cambiare i feromoni ogni 5 settimane.

ASSEMBLAGGIO E ANCORAGGIO DELLE TRAPPOLE:

Assemblare le trappole ancorandone la base al terreno con picchetti o pietre di idoneo peso, per evitare che vengano rovesciate oppure spazzate via dal vento forte.

AVVERTENZE:

La scelta di un luogo idoneo per il posizionamento della trappola risulta fondamentale per il successo del monitoraggio e dell'attività di cattura delle forme mobili dell'insetto.

CAMBIO FEROMONI:

Il feromone in dotazione esercita un'azione attrattiva completa di 5 settimane. Trascorso questo periodo, si consiglia di sostituirlo con uno nuovo conservato in condizioni ideali.

